

Réduction des endomorphismes et des matrices carrées

1. CONTEXTE. \mathbb{K} désigne \mathbb{R} ou \mathbb{C} .

On considère

- $n \in \mathbb{N}^*$ un entier naturel ;
- $A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée ;
- E un espace vectoriel de dimension finie n ;
- $u \in \mathfrak{L}(E)$ un endomorphisme de E .

Polynôme caractéristique

2. THÉORÈME. L'application

$$\mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}, x \mapsto \det(A - x I_n)$$

est polynomiale en x .

3. DÉFINITION. Le *polynôme caractéristique* de A est le polynôme défini pour tout $x \in \mathbb{K}$ par

$$\chi_A(x) = \det(x I_n - A) = (-1)^n \det(A - x I_n).$$

4. THÉORÈME. Pour tout $x \in \mathbb{K}$,

$$\chi_A(x) = x^n - \text{Tr}(A)x^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det(A).$$

5. THÉORÈME. Deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique.

6. THÉORÈME. Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A) \iff \chi_A(\lambda) = 0.$$

7. DÉFINITION. Soit $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$. La *multiplicité* de λ , notée $m(\lambda)$, est la multiplicité de λ comme racine de χ_A . On l'appelle aussi l'*ordre* de λ , noté $\text{ord}(\lambda)$.

8. THÉORÈME. Si χ_A est scindé sur \mathbb{K} , alors

$$\begin{aligned} \text{Tr}(A) &= \sum_{\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)} m(\lambda) \lambda, \\ \det(A) &= \prod_{\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)} \lambda^{m(\lambda)}. \end{aligned}$$

9. THÉORÈME. Pour tout $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$,

$$1 \leq \dim(E_\lambda(A)) \leq m(\lambda).$$

10. THÉORÈME DE CAYLEY-HAMILTON. Le polynôme caractéristique de A est annulateur de A , c'est-à-dire que $\chi_A(A) = 0_{\mathfrak{M}_n(\mathbb{K})}$.

11. DÉFINITION. Le *polynôme caractéristique* de u est le polynôme défini pour tout $x \in \mathbb{K}$ par

$$\chi_u(x) = \det(x \text{id}_E - u) = (-1)^n \det(u - x \text{id}_E).$$

12. REMARQUE. Comme les déterminants de matrices semblables sont égaux, χ_u se calcule avec n'importe quelle matrice de u , et tout le vocabulaire concernant les matrices s'étend aux endomorphismes.

Diagonalisation

13. DÉFINITION. u est *diagonalisable* si E est la somme directe des sous-espaces propres de u , c'est-à-dire si

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_\lambda(u).$$

14. THÉORÈME. u est diagonalisable si et seulement s'il existe une base de E constituée de vecteurs propres pour u .

15. THÉORÈME. u est diagonalisable si et seulement s'il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est diagonale.

16. THÉORÈME. u est diagonalisable si et seulement si toute, respectivement n'importe quelle, matrice de u est semblable à une matrice diagonale.

17. THÉORÈME. u est diagonalisable si et seulement si

$$\begin{cases} \chi_u \text{ est scindé sur } \mathbb{K}, \\ \forall \lambda \in \text{Sp}(u), \dim(E_\lambda(u)) = m(\lambda). \end{cases}$$

18. THÉORÈME. u est diagonalisable si et seulement si

$$\dim(E) = \sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \dim(E_\lambda(u)).$$

19. THÉORÈME. u est diagonalisable si et seulement s'il admet un polynôme annulateur scindé sur \mathbb{K} et à racines simples.

20. COROLLAIRE. Si χ_u est scindé sur \mathbb{K} , à racines simples, alors u est diagonalisable. La réciproque est fausse.

21. THÉORÈME. u est diagonalisable si et seulement si le polynôme $\prod_{\lambda \in \text{Sp}(u)} (X - \lambda)$ est annulateur de u .

22. DÉFINITION. A est *diagonalisable* si elle est semblable à une matrice diagonale, c'est-à-dire s'il existe deux matrices $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ et D diagonale telles que $A = PDP^{-1}$.

23. REMARQUE. Grâce aux matrices canoniquement associées aux endomorphismes, tous les théorèmes précédents sont valables pour les matrices.

Trigonalisation

24. DÉFINITION. A est *trigonalisable* si elle est semblable à une matrice triangulaire, supérieure ou inférieure, c'est-à-dire s'il existe deux matrices $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ et T triangulaire telles que $A = PTP^{-1}$.

25. DÉFINITION. u est *trigonalisable* s'il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est triangulaire, supérieure ou inférieure.

26. THÉORÈME. A , respectivement u , est trigonalisable si et seulement si χ_A , respectivement χ_u , est scindé sur \mathbb{K} .